四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷六十二

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官原任編修臣勵守謙

謄録監生臣邵敬修

景岳全書卷六十二

明 張介賓 撰

小兒

秘旨補脾湯一 治小兒久病面黄肌瘦咬牙目劄頭髮稀少誤藥所致

人參 白术各一錢 白芍藥酒炒 白茯苓各八分 川芎 陳皮各六分 炙甘草

黃芪蜜炙　當歸各四分

右每服二三錢薑水煎

調中湯二　治傷乳食瀉後脾胃虚噦吐瀉

人參　茯苓　乾薑炒　藿香

白术　甘草炙　木香　丁香

香附炒去毛　砂仁等分

右水煎食前服

調中丸三　治脾胃虚寒吐瀉

人參　白术炒　甘草炒各五錢　乾薑炮四錢

右爲末蜜丸菉豆大每服二三十丸白湯下○薛按云前二方乃本經自病之藥即人參理中丸也若腎水侮土而虛寒者當加半夏茯苓陳皮或嘔吐更加藿香泄瀉加木香

人參理中丸四　治中氣虛熱

人參　白术炒　炙甘草等分

右爲末薑汁糊丸菉豆大每服二三十丸白湯下

局方觀音散五　治内傷嘔逆吐瀉不進飲食漸至羸瘦

人參一兩　神麯炒　茯苓　炙甘草

綿黄芪　白朮炒　白扁豆炒　木香各一錢

石蓮肉去心錢半

右爲末每服一二錢入藿香三葉薑棗水煎服

助胃膏六　治脾胃虚寒吐瀉飲食不化等證

人參　白朮炒　茯苓　甘草炙

丁香各五錢　山藥一兩炒　砂仁四十個　木香三錢

白豆蔻十四個 肉豆蔻四個麪煨 一方無木香名香砂助胃膏

右爲末蜜丸芡實大每服十九米飲化下

錢氏七味白朮散七 一名人參白朮散○治虛熱而渴

人參 白朮 白茯苓 炙甘草

藿香 木香各一錢 乾葛二錢

右爲末每服三錢水煎溫服如飲水多多服之爲妙

○按此方治小兒虛熱而渴如無氣滯吐瀉等證則

當減去木香藿香以避燥而耗氣

白术散八　方在和陣三十

治自汗盜汗極效

太和餅九

人參　白术　白茯苓各五錢　山藥炒四錢

木香　炙甘草各二錢　肉果麪煨四個　白豆蔻十四個

砂仁十四個　山查肉一兩　史君子肉六十個

煉蜜搗和爲小餅量兒大小與服○或再對證加減
藥味用之

團參散 十 治心虛血熱自汗盜汗

人參 當歸 等分

右爲末用雄猪心一個切三片每服二錢以猪心一
片煎湯調服或用水煎服亦可

止汗散 十一 一名敗蒲散○治睡而自汗

故蒲扇 燒存性

右爲末每服三錢溫酒調下

調元散十二 治小兒變蒸脾弱不乳吐乳多啼

人參 白术 陳皮 厚朴製

香附各一錢 炙甘草 藿香各五分

右每服一二錢薑棗煎服

平和飲子十三 治小兒變蒸於三月後每三日進一服可免百病百日內宜服

人參一錢半 白茯苓一錢 炙甘草五分 升麻二分

右咀水半盞煎三分不時服○弱者加白术一錢

調氣散十四 治變蒸吐瀉不乳多啼欲發慢驚

人參 陳皮 木香 藿香

香附 炙甘草各一錢

右爲末每服一錢薑棗水煎服

錢氏當歸散十五 治夜啼不乳

人參 當歸 白芍藥各二錢半 炙甘草二錢

桔梗 陳皮各一錢分

右每服一二錢水煎灌之

撮要當歸散十六　治變蒸有寒無熱

當歸二錢　人參　炙甘草　木香

官桂各一錢

右每服二三錢薑棗水煎

人參黃連散十七　治心經蘊熱夜啼

人參二錢半　黃連錢半炒　炙甘草五分　竹葉二十片

右薑水煎服

燈花散十八　治心躁夜啼　無擇

燈花二三顆

右研細用燈草煎湯調塗口中乳汁送下日三服一法用燈花塗乳上令兒吮之○如無燈花用燈草燒灰加辰砂少許亦妙○一法用燈花七枚硼砂一字辰砂少許蜜調塗唇上立安

天麻散十九　治小兒急慢驚風發熱抽搐痰涎壅盛或脾土虛弱肝木乘侮吐瀉不食嗜卧困倦　寶鑑

半夏七錢　天麻二錢半　甘草炙　白茯苓

白术各三錢

右爲末每服一二錢薑棗湯調服

湯氏異功散二十　止渴消暑生津補脾胃

猪苓　澤瀉各三錢　人參　白术

茯苓各五錢　陳皮二錢半　砞砂一錢

右爲末蜜丸芡實大每服一丸燈心竹葉湯化下

柴胡散二一　治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參　炙甘草　麥冬各二錢　龍膽草酒炒黑　防風各一錢　柴胡五分

右每服二三錢水煎

柴苓散二二　治壯熱來去

柴胡　赤茯苓　人參　麥冬　甘草各半兩　黄芩一兩

右每服二三錢入小麥二十粒青竹葉三片水煎服

惺惺散二三　治小兒傷寒時氣風熱頭痛目昏多睡

痰壅欬嗽喘急或痘疹已出未出疑似之間

人參　白术炒　茯苓　甘草

北細辛　川芎　桔梗炒各等分

右爲末每服二錢入薄荷五葉水煎服○一方有防

風天花粉

星蘇散二四　治諸風口噤不語

南星切炮

右每服五七分紫蘇五葉薑四片水煎入雄猪膽少

許溫服

錢氏黄龍散 二五 治發熱不退或往來寒熱

柴胡 五錢 赤芍藥 三錢 黄芩 炒 甘草 炙各二錢

右每服二三錢薑棗水煎

人參羗活散 二六 治傷風驚熱

人參 羗活 川芎 白茯苓

柴胡 前胡 獨活 桔梗

枳殼 地骨皮 天麻 各等分 炙甘草 減半

右用生薑薄荷水煎○治驚熱加蟬蜕

牛黄散二七 治溫熱壯熱或寒熱往來

牛黄研 甘草各半兩 柴胡 梔子酒炒

龍膽草酒炒 黄芩炒各二錢半

右爲末每服五七分以金銀薄荷湯調下

錢氏生犀散二八 治心經風熱

犀角鎊三錢 柴胡 葛根 赤芍藥

地骨皮各一兩 甘草五錢

右爲末每服一二錢水煎

三黄犀角散 二九 治温熱心神不安火腑秘結

犀角屑 大黄 酒浸蒸 鈎藤鈎 梔子仁

甘草 黄芩 等分

右爲末每服五七分熱湯調下量兒加減

柴胡飲子 三十 解肌熱蒸熱積熱或汗後餘熱脈洪

實弦數大便堅實者

柴胡 人參 各五分 黄芩 芍藥 各七分

當歸一錢　甘草四分　大黄八分

右每服一二錢水煎○按此方用藥頗善但大便如常者勿得輕用大黄

地骨皮散三一　治虚熱壯熱

地骨皮　知母　人參　柴胡

茯苓　半夏　甘草等分

右薑水煎有驚熱加蟬蜕天麻黄芩

天麻定喘飲三二　治喘嗽驚風

天麻　防風　羌活　白术

甘草炒　人參　桔梗　川芎

半夏麯等分

右每服二三錢水煎服

補脯散三三　一名阿膠散○治肺虛惡心喘急久患

欬嗽有痰

阿膠兩半炒　鼠粘子炒　馬兜鈴各半兩　杏仁七粒

糯米一兩　甘草三錢

右每服二三錢水煎服

錢氏阿膠散 三四 治小兒肺病欬嗽喘急或欬而哽氣喉中有聲

阿膠 一兩蛤粉炒 鼠粘子 炒香二錢半 炙甘草 一錢

馬兜鈴 半兩炒 杏仁 七個去皮尖 糯米 一兩

右每二三錢水煎

丹溪保和丸 三五 治飲食酒積停滯胸膈痞滿腹脹

神麯 炒 陳皮 半夏 茯苓 各一兩

山查肉蒸曬三兩　連翹　蘿蔔子炒各五錢

右爲末粥丸菉豆大○一方尚有炒麥芽一兩黄連五錢

大安丸三六　治證同前

即前保和丸加白术二兩

楊氏消食丸三七　治乳食過多胃氣不能消化

砂仁　陳皮　神麯炒　麥芽炒

三稜　蓬术各半兩　香附炒一兩

右為末麪糊丸麻子大白湯送下量兒加減

消乳丸 三八　治嘔吐消乳食脉沈者傷食不化也

香附炒　砂仁　陳皮　神麯炒

炙甘草　麥芽炒等分

右為末蜜糊丸黍米大每服二十九薑湯下

白餅子 三九　治傷食腹中有癖嘔吐肚疼先用此藥

服推下食積然後調治不可服冷藥

滑石　輕粉　半夏湯浸焙　南星各一錢

巴豆二十四粒去皮膜用水一升煮乾研爛

右爲末糯米飯丸菉豆大捻作餅每服二三餅煎葱白湯或紫蘇湯下忌熱物量兒加減

薛曰凡用此方及利驚丸紫霜丸三味牛黄丸褊銀丸之類乃斬關奪門起死回生之重劑也必審形病俱實方可施之恐至失手命在反掌經云邪之所凑其氣必虚留而不去其病乃實實者病氣實而形氣則虚也東垣先生云形病俱實者當瀉不當補形病

俱虛者當補不當瀉治者審焉

宣風散四十　治濕痰去積滞通秘結攻黑陷裏實以

代百祥丸牛李膏

檳榔二個　陳皮　甘草各五錢　牽牛四兩半生半炒取頭末一兩

右為末每一錢量大小增減與服白湯調下〇一方

有大黄木香連前三味煎成後加牽牛末調服

人參養胃湯四一　治外感風寒内傷生冷寒熱如瘧

或嘔逆惡心

人參　厚朴薑製　蒼朮炒　半夏製

草果仁　藿香　茯苓各五錢　橘紅二錢半

炙甘草二錢

右每服二三錢薑三片烏梅一個水煎

人參安胃散四二　治脾胃虛弱傷熱乳食嘔吐瀉痢

人參一錢　黃芪二錢　生甘草　炙甘草各五分

白芍藥酒炒七分　白茯苓四分　陳皮三分

黄連炒二分

右每服二三錢水煎

生附四君湯四三 治吐瀉不思乳食凡虛冷病宜先與數服以正胃氣

人參 白术 茯苓 炙甘草

附子 木香 橘紅等分

右爲末每服一二錢薑棗水煎服

釀乳法四四 治胃虛吐瀉睡中吐舌摇頭嘔乳額上

汗流驚啼面黃令兒饑飲

人參　藿香　木香　沈香

陳皮　神麯炒　麥芽炒各等分　丁香

右每服四五錢薑十片紫蘇十葉棗三枚水煎每服半盞〇令母食後捏去舊乳方服卧少時却與兒飲

按小兒不能飲藥者凡用補瀉諸劑皆宜此法

銀白散四五　治胃虛吐瀉

糯米炒二兩半　扁豆蒸二兩　白术炒一兩　炙甘草三錢

丁香　藿香各二錢

右爲末紫蘇米飲調下○直指方加炮白附子全蝎木香石蓮子薑水煎

朱君散四六　治吐瀉後而爲驚爲瀉及糞青者

人參　白术　茯苓　炙甘草

鈎藤鈎　硃砂各一錢　麝香半分　燈心一圓

右爲末每服一錢白湯調下

三順散四七　治中暑霍亂吐瀉煩悶燥渴小便赤澁

便血肚疼

白朮 炙甘草 茯苓 猪苓

澤瀉 乾薑炒 肉桂 杏仁去皮尖炒

各等分

右爲末每服五七分不拘時水調下或用水煎服

香朴散四八 治積冷嘔吐

藿香葉 厚朴薑汁炒 陳皮各七錢 半夏湯泡七次

一兩 炙甘草一錢

右每服三錢薑棗水煎○瀉甚者加木香肉荳蔻

沈香散 四九 順胃氣止嘔吐

茯苓 二錢　沈香　丁香　木香

藿香　厚朴　炙甘草 各一錢

右為末每服一字米飲湯調服

玉露散 五十 治傷熱吐瀉

石膏 煅　寒水石 各五錢　甘草 二錢半

右為末每服五分白湯調下

六神散 五一 治面青啼哭口出氣冷或泄瀉不乳腹痛曲腰四肢厥冷

人參 白朮炒 山藥炒各五錢 炙甘草二錢

白茯苓 白扁豆炒各一兩

右爲末每服二三錢薑棗水煎

香橘餅 五二 治傷冷積瀉

木香 青皮各一錢 陳皮二錢半 厚朴

神麴炒 麥芽炒各半兩

右為末蜜和為餅每服一枚米飲調下

錢氏黃芩湯五三　治挾熱下痢頭痛胸滿大渴或寒熱脇痛脉洪大而實者

黃芩一兩半　芍藥　甘草炒各一兩

右每服二三錢薑水煎○如嘔加半夏二錢

澁腸散五四　治小兒久痢腸頭脫出

訶子炮　赤石脂　龍骨各等分

右為末臘茶少許和藥摻腸頭上絹帛揉入

破故紙散 五五 治膀胱虚冷夜間遺尿或小水不禁

破故紙 炒

右爲末每服一錢熱湯調下

陳氏肉豆蔻丸 五六 治瀉痢水穀或淡黃或白不能止者

肉豆蔻　訶子肉　白龍骨各半兩　木香

砂仁各二錢　赤石脂　枯白礬各七錢半

右爲細末麪糊爲丸黍米大周歲兒每服三五十丸

三歲兒服百丸溫米飲下瀉甚者煎木香散或異功散送下不止多服○薛按前方治陽氣虛寒腸滑之泄痢蓋腎主大便若因腎氣不固而致前證者宜用木香散送四神丸如不應急煎六君子湯送四神丸補之蓋豆蔻丸濇滯之功多補益之功少也

寧神湯五七 治心虛火盛熱躁驚搐等證

人參 當歸身 生地 麥冬各一錢

山梔仁 黃連炒 炙甘草各二錢 石菖蒲三分

辰砂入二分

右加燈心半錢水一盞煎七分調辰砂攪勻食後溫服

當歸養心湯 五八 治心虛驚悸

歸身 麥冬 生地酒洗 人參

炙甘草 升麻少用

水一鍾半加燈草一圜煎七分食遠服

錢氏養心湯 五九 治心血虛怯驚癇或驚悸怔忡盜汗

無寐發熱煩躁

人參　黄芪　遠志　當歸

川芎　棗仁　五味子　栢子仁

肉桂　白茯苓　茯神　半夏麯各二錢

炙甘草四錢

右每服二三錢薑棗水煎

茯神湯六十　治膽氣虚寒頭痛目眩心神恐懼或是驚癇

人參　黄芪炒　棗仁炒　熟地

白芍炒　栢子仁炒　五味子炒　茯神各一兩

桂心　甘草炒各五錢

右每服二三錢水煎

清神湯六一　治驚癇心虚血熱

犀角鎊屑　遠志薑汁焙　白鮮皮　石菖蒲

人參　甘草等分

右爲末每服五七分麥門冬煎湯調服

錢氏酸棗仁湯六二　治心肺虛熱煩躁驚啼痘疹血熱血燥等證

棗仁　炙甘草　人參　生地

麥冬　當歸身　梔子仁等分

右加燈心水一盞煎六分溫服

黑附子湯六三　治慢脾風四肢厥冷

附子三錢炒去皮　木香　人參各一錢半　白附子一錢

炙甘草五分

右爲散每服三錢薑五片水煎○若手足即溫即止後服

鈎藤散六四 治吐利脾胃氣虛慢驚生風

鈎藤鈎 人參 天麻 蝎尾去毒

防風 蟬殼各半兩 麻黃 殭蠶炒

炙甘草 川芎各二錢半 麝香五分

右㕮咀每服二三錢水煎服○虛寒加附子一錢

薛按慢驚之證屬脾胃虧損所致前方乃辛溫散表

之藥而無調補之功須審用之

鈎藤飲子六五　治小兒一切驚風潮搐目視昏迷

鈎藤鈎　防風　獨活　天竺黄

羌活各三錢　麻黄　升麻　甘草

草龍膽各二錢　川芎三錢　蟬蛻五個去頭足

右每服二三錢薑棗水煎服○薛立齋曰按右方若外感風寒形證俱實者宜用之若形氣虛而病氣實者宜用惺惺散如鈎藤麻黄若外邪少而形病俱虛

者宜異功散

錢氏鉤藤飲六六 治小兒臟寒夜啼陰極發躁

鉤藤鉤 茯神 茯苓 當歸

川芎 木香各一錢 甘草五分

右每服二錢薑棗水煎服○撮要方有芍藥一錢○若心經有熱臉紅便赤去木香加硃砂末一錢木通湯下

薛氏抑肝散六七 治肝經虛熱發搐或發熱咬牙或驚

悸寒熱或木乘土而嘔吐痰涎腹脹少食睡不安

軟柴胡　甘草各五分　川芎八分　當歸

白术炒　茯苓　鈎藤鈎各一錢

右水煎子母同服○以蜜丸名抑青丸

大青膏六八　治傷風痰熱發搐

天麻　青黛各一錢　白附子煨　烏蛇酒浸取肉

焙　蝎尾各五分　天竺黄　麝香各一字

右為末生蜜丸豆大每用半粒薄荷湯化下

地黄清肺飲 六九 治肺熱𤸪蝕穿孔或生瘜肉或鼻

外生瘡

桑白皮 半兩炒 紫蘇 前胡 赤茯苓

防風 黄芩 當歸 天門冬

連翹 桔梗 生地 甘草 炙各二錢

每服五七錢水煎服次用化𧏾丸

甘草湯 七十 治撮口

甘草 生用一錢

右水煎以綿毬醮吮令出痰涎却以猪乳點入口中即瘥

秘旨安神丸 七一 治心血虚而睡中驚悸或受驚嚇而作

人參 棗仁 茯神 半夏各一錢

當歸 芍藥炒 橘紅各七分 五味子五粒

炙甘草三分杵

右爲末薑汁糊丸芡實大每服一丸生薑湯下

七味安神丸七二　治心經蘊熱驚悸

黃連　當歸身　麥門冬　白茯苓

甘草各半兩　硃砂飛一兩　冰片二分半

右爲末湯浸蒸餅和豶豬心血搗丸黍米大每服十

丸燈心湯下

十味安神丸七三　治驚

人參　茯神　麥門冬　山藥各一錢

片腦一分　龍齒二錢　硃砂　甘草

寒水石各五分 金箔二片

右爲末蜜丸雞豆大燈心湯調下○一方有馬牙硝

硃砂安神丸七四 方在寒陣一四二

清心火養血安神

錢氏安神丸七五 方在寒陣一四三

除火邪熱渴清心化痰

安神鎮驚丸七六 驚退後調理安心神養氣血和平

預防之劑也

天竺黄另研　人參　南星薑製　茯神各五錢

當歸　棗仁炒　麥冬　生地

芍藥炒各三錢　黄連薑汁炒　薄荷　木通

山梔炒　硃砂另研　牛黄另研　龍骨煅各二錢

青黛一錢另研

右爲末蜜丸菉豆大每服三五丸量兒大小加減淡

薑湯送下

萬氏龍腦安神丸七七　治驚癇及痘中昏悶譫妄良方

大辰砂一錢飛　牛黄一分　龍腦半分

右研細末取豮猪心血小猪尾尖血和丸如菉豆大每服一丸或二三丸新汲水化下或燈心湯紫草湯俱可下

鎮心丸七八　治急驚化痰鎮心

硃砂　龍齒　牛黄各一錢　鐵粉

人參　茯苓　防風　琥珀各二錢

全蝎七枚焙

右爲末蜜丸桐子大每服一二丸薄荷湯送下

金箔鎮心丸七九　治風壅痰熱心神不寧驚悸煩渴脣焦頰赤夜卧不安譫語狂妄

金箔十二貼爲衣　硃砂一兩飛　人參　白茯苓

甘草各半兩　山藥一兩半　牙硝一錢半　麝香五分

片腦一分

右爲末煉蜜丸每一錢作十丸以金箔爲衣每服一丸薄荷湯化下或含化亦可

辰砂膏八十　治眼閉口噤啼聲不出吮乳不得口吐白沫

辰砂三錢　硼砂　馬牙硝各一錢半　玄明粉　全蝎　真珠各一錢　麝香一分

右爲末每服一豆許諸驚薄荷湯下潮熱甘草湯下月内者用乳汁調塗乳頭令吮之

琥珀散八一　治急慢驚風涎潮昏冒驚搐目瞪内釣腹痛或驚癇時發

琥珀　牛黃　膽星此當倍用　白附子

天麻　殭蠶炒去絲嘴　代赭石　全蝎

蟬蜕　乳香各一錢　硃砂一錢半

右爲末每服一二分白湯調下

龍膽湯八二千金　治月内臍風撮口四肢驚掣發熱吐乳及客忤鬼氣驚癇加人參當歸

龍膽草炒黑　鈎藤鈎　柴胡　黄芩炒

芍藥炒　桔梗　茯苓　甘草

大黄煨各二錢半 蠷螂二枚去翅足

右爲末每服一二錢水煎量兒加減

梅花飲八二 治五臟積熱喉中有痰面色赤白鼻流青涕氣逆喘急目赤欬嗽或因驚夜啼

硼砂 馬牙硝 芒硝 辰砂各一錢

人參二錢 甘草五分 片腦半分 麝香一分

右爲末磁器收貯每服半匙麥冬湯調服或薄荷湯亦可

擦牙通關散 八四 治風搐關竅不通痰塞中脘留滯

百節

南星 二錢 麝香 一字 牙皂 二錢燒存性 殭蠶 一錢

赤脚蜈蚣 一條

右爲末薑汁醮藥少許擦牙或調服二三點涎自出

陳氏抱龍丸 八五 治風痰壅盛或發熱欬嗽或發驚搐

等證

膽星 九製四兩 天竺黄 一兩 雄黄 硃砂 各五錢

麝香五分另研或減半亦可

右爲細末用大甘草一斤煮極濃汁搗丸每兩作二十丸陰晾乾用薄荷湯或燈草湯下一二丸〇此方加牛黄四錢即名牛黄抱龍丸加琥珀即名琥珀抱龍丸

至聖保命丹八六 治胎驚肉釣肚腹緊硬啼叫不安乃急驚風眼目上視手足抽搐不省人事

全蝎十四個去毒 防風二錢 炮南星 白附子

蟬蛻　殭蠶去絲嘴炒　天麻　硃砂各一錢

麝香五分　金箔

右爲末米糊和每兩作四十九每服一丸白湯化下有熱者以南星易炮星○此方去天麻加琥珀捏成錠以薄荷湯磨服即名保生錠子亦名太乙保生丹治慢驚尚有陽證者

定命丹八七　治天釣撮口通利痰熱

全蝎七枚　天麻　南星炮　白附子各二

錢半 硃砂 青黛各一錢半 輕粉
麝香各五分 片腦一字
右為末米糊丸菉豆大每服一二丸荊芥薄荷湯下
可先研半丸吹入鼻中
九還金液丹 八八 此藥有斡旋造化之功專治男婦
痰盛氣急中風不語口眼歪斜左癱右瘓牙關緊急
及小兒急驚風手足抽搐不省人事痰多氣急等證
功效不可盡述

膽星九製者二兩　硃砂飛一兩　生牛黃五錢　殭蠶炒五錢

牙皂去皮絲炒焦三錢　冰片　麝各五分

小麥麪炒熟煉蜜和勻搗九芡實大金箔爲衣黃蠟

匾收藏○如大人牙關緊急先以通關散開其竅隨

用淡薑湯化下一二九○若治小兒用薄荷湯化下

一九

膽星天竺九八九　治小兒痰涎上壅喘嗽不休

膽星一兩　天竺黃三錢　半夏薑製　白附子湯泡

天麻去皮 防風各二錢 辰砂一錢飛 麝各五錢

右為末甘草湯為丸芡實大每服一丸空心薄荷湯或淡薑湯下

陳氏溫白丸九十　驅風豁痰定驚

人參　防風　白附子生用　真殭蠶炒　全蝎焙各一錢　南星湯泡七次焙　天麻各三錢

右用末水糊丸桐子大每服三五丸薑湯下

粉紅丸九一　治小兒心虛困臥驚動痰涎不利或發

熱痰嗽等證

天竺黄五錢 天南星 硃砂各一錢半 冰片 胭脂各一錢

右以牛膽汁和丸芡實大每服一丸砂糖湯下

錢氏牛黄丸九二 治風癇因汗出風邪乘虛而入痰涎迷悶手足搐掣

牛膽南星 全蝎焙 蟬蜕各二錢半 防風 白附子生用 天麻 殭蠶炒各一錢半 麝香半字

右爲末棗肉和丸加水銀半錢同研細丸菉豆大每服一二丸荆芥生薑湯下

牛黃丸 九三 雜著 治小兒驚風中風五癇天弔客忤潮熱痰涎壅盛等證

白花蛇 酒浸　白附子　川烏　全蝎

天麻　薄荷　雄黃 各五錢　硃砂 二錢

牛黃　麝香 各一錢　冰片 五分

右各另研爲極細末和匀用麻黃煎酒擣丸芡實大

每服一丸薄荷湯下

萬氏牛黄清心丸九四　治心熱神昏

黄連生半兩　黄芩　山梔仁各三錢　鬱金二錢

辰砂一錢半　牛黄二分半

右爲細末臘雪調麪糊丸如黍米大每服七八丸燈心湯下

三味牛黄丸九五　治驚熱消痟積

雄黄飛　牽牛各一錢　天竺黄二錢

右為末麪糊丸粟米大每服五七丸薄荷水下

凉驚丸　九六　治驚疳熱搐睛赤潮熱痰涎牙關緊急

龍膽草炒焦　防風　青黛各三錢　鈎藤鈎二錢

黄連炒五錢　龍腦一錢　牛黄　麝香各二分

右為末麪糊丸粟米大每服十丸煎金銀花湯下

利驚丸　九七　治急驚

天竺黄二錢　輕粉　青黛各一錢　黑牽牛炒五錢

一方無天竺黄

右爲末煉蜜丸豌豆大每歲一丸薄荷水化下

錢氏抑青丸九八 治肝熱急驚搐搦

羌活　川芎　當歸　防風

龍膽草等分

右爲末煉蜜丸芡實大每服一二丸竹葉湯入砂糖化下〇此方加大黃梔子仁即名瀉青丸

化痰丸九九 治驚搐喉內痰響者暫用

膽星　半夏製　礞石製　枳實各二兩

麝香三分

右爲末薑汁糊丸菉豆大硃砂爲衣薑湯研化量送

比金丸百 治驚癇先用此藥

人參 遠志薑製取肉炒 白茯苓 南星

川芎 石菖蒲細密者 天麻 硃砂

青黛 琥珀各一錢 麝香一字

右爲末蜜丸桐子大每服一二丸金銀薄荷湯下

虎睛丸百一 治驚癇邪氣入心

虎睛細研 遠志薑汁浸 犀角鎊屑 石菖蒲

大黄濕紙包煨 麥冬等分 蠼螂去足翅炒三枚

右為末米糊丸梧子大每服一二丸竹葉煎湯或金銀薄荷湯下

五癇丸百二 一名五色丸 治五癇

硃砂 真珠各五錢 雄黄一兩 水銀一錢半

黑鉛三兩同水銀結成砂

右為末煉蜜丸麻子大每服三四丸煎金銀 荷湯

下

斷癇丹 百三 治五癇瘥後復發證候多端連綿不除者

黃芪 蜜炙 鈎藤鈎 細辛 炙甘草 各半兩

蛇蛻 二寸酒 蟬蛻 四個 牛黃 一錢另研

右為末煮棗肉丸麻子大煎人參湯下每服數丸量兒加減

消風丸 百四 治風癇先宜此藥

膽星二錢 羌活 獨活 防風

天麻 人參 荊芥 川芎

細辛各一錢

右為末蜜丸桐子大每服二丸薄荷紫蘇湯調化下

妙聖丹百五 治食癇因驚而停食吐乳寒熱大便酸臭是也

赭石煆酸淬二錢半 巴霜三分 硃砂 雄黃

蝎梢各一錢 輕粉 麝香各一匙 杏仁微炒二錢

右爲末棗肉丸梧子大每服一二丸木賊草煎湯送下

褊銀丸百六 治癲癎膈熱風涎壅盛腹脹喘促實滯者

巴豆 水銀各五錢 京墨八錢火燒醋淬 黑鉛二錢半水銀煎 麝香五分另研

右爲末陳米粥丸菉豆大每服二三丸煎薄荷湯下

薛氏紫河車丸百七 治癲癎

紫河車肥大者一具　人參　當歸二味酌用爲末

右將河車生研爛入二藥搗丸桐子大每服五七十丸日進三服人乳化下○按此方凡先天不足後天虧敗者俱可隨宜增用藥物照此製服無不可也然河車必用酒頓熟方善雖薛氏之意用其生氣但生者腥臊恐不利於胃氣且此物既離本體尚何生氣之有亦不過取其應求之性味爲血氣之資而已矧人之血氣本皆熟物之所養成故飲食之類凡生用

熟用其補瀉有甚相遠者豈熟之即無益而生之果無礙耶余故曰熟之爲宜

人蕪荑湯百八　治小兒脾疳發熱作渴少食大便不調髮黄脱落面黑鼻下生瘡能乳嗜土等證

蕪荑　山梔各五分　當歸　白术

茯苓各四分　柴胡　麻黄　羌活各三分

防風　黄連　黄栢　炙甘草各二分

右作二劑水煎服

生熟地黃湯百九 治痘眼閉合不開

生地黃　熟地黃各半兩　川芎　赤茯苓

枳殼　杏仁去皮　川黃連　半夏麯

天麻　地骨皮　炙甘草各二錢半

右每服二三錢黑豆十五粒薑水煎服

蘭香散百十 治鼻疳赤爛

蘭香葉二錢燒灰　銅青　輕粉各五分

右爲末乾貼

四味肥兒丸百十一 治小兒食積五疳目生雲翳牙根腐爛口舌生瘡發熱體瘦肚大筋青髮稀成穗或白禿瘡疥小便澄白等證

蕪荑炒 神麯炒 麥芽炒 黄連各等分

右爲末豬膽汁丸黍米大每服二三十丸木通煎湯下

六味肥兒丸百十二 消疳化蟲退熱

黄連　陳皮　川練子去核炒　神麯炒

麥糵炒各一兩　白蕪荑半兩

右爲末糊丸麻子大每服一二十丸空心米飲呑下

薛氏曰前方又治脾疳飲食少思肌肉消瘦肚大頸細髮稀成穗項間結核發熱作渴大便酸臭嗜食泥土或口鼻頭瘡肚見青筋齧齒便白五疳用此丸加乾蟾一兩尤妙

七味肥兒丸百十三　治小兒食積五疳頸項結核髮

稀成穗發熱作渇消瘦等證

黃連炒 神麯炒 木香各一兩半 檳榔二十個

史君子酒浸 麥芽炒各四兩 肉豆蔻炮二兩

麪糊丸麻子大每服三五十丸米飲下良久用五味

異功散一服以助胃氣

蘆薈肥兒丸百十四 治疳熱

蘆薈 龍膽草酒洗 木香 人參

史君子肉 蚵蚾酥炙去頭足即上𪓟 麥芽炒各二錢

檳榔　黃連去蘆鬚酒炒　白蕪荑各三錢　胡黃連五錢

右爲細末猪膽汁爲丸黍米大每服五六十丸米飲下

大蘆薈丸百十五　一名九味蘆薈丸○治小兒肝脾疳積發熱體瘦熱渴大便不調或瘰癧結核耳内生瘡牙齦蝕爛目生雲翳等證

胡黃連　黃連　蘆薈　白蕪荑炒

白雷丸破開赤者不用　木香　青皮

鶴虱草（微炒各一兩）　麝香（一錢另研）

右為末蒸餅糊丸麻子大每服一錢空心白湯送下

○立齋曰內青皮以龍膽草代之麝香不用尤效

加減蘆薈丸（百十六）　治證同前尤治小兒疳積腹脹

蘆薈（真者五錢）　宣黃連（去鬚）　胡黃連　枳實

青皮（各二錢半）　青黛　木香　山查肉（各二錢）　麥芽（炒三分）　麝（一分）　乾蝦蟇（一隻酥炙）

右爲細末湯浸蒸餅爲丸菉豆大每服七八分量兒大小與之○按此方加史君子肉三錢治濕熱生蟲亦佳

當歸龍薈丸 百十七 方在寒陣一六七

治肝經實火大便秘結

良方蘆薈丸 百十八 方在寒陣一六八

治疳癖發熱諸證

龍膽丸 百十九 治腦疳腦熱瘡

龍膽草 升麻 苦楝根皮焙 赤茯苓
防風 蘆薈 油髮灰各二錢 青黛
黃連各三錢
右為末牡豬膽汁浸米糕丸麻子大薄荷湯下仍以
蘆薈末敷入鼻內
木香丸百二十 治疳痢
黃連淨三錢 木香 紫厚朴製 夜明砂紙炒
各二錢 訶子肉炒一錢

右爲末飯丸麻子大乾艾生薑煎湯食前下

黃連丸 一二一 治疳勞

黃連半兩淨牛膽汁浸曬 石蓮子 瓜蔞根

杏仁去皮尖 烏梅肉各二錢

右爲末牛膽汁浸糕丸麻子大煎烏梅薑蜜湯下

胡黃連丸 一二二 治熱疳

胡黃連 黃連各五錢 硃砂二錢

右爲末填入猪膽内以線扎懸掛銚中淡漿水煮數

沸取出研蘆薈麝香各二錢入之飯和丸麻子大每服一二十丸米飲下

蟾蜍丸 一二三 治小兒頸項結核面色痿黄飲食不甘腹大發熱名曰無辜疳證一服虚熱退二服煩渴止三服瀉痢愈

蟾蜍 一二個 夏月溝渠深土中取腹大不跳不鳴者是身多癗者佳

右將糞蛆一杓置桶中以尿浸之却將蟾蜍跌死投

與蛆食一晝夜用布袋盛蛆置急流中一宿取出瓦上焙乾爲末入麝香一字粳米飯丸麻子大每服二三十丸米飲下其效如神

天麻丸 一二四 治肝風疳眼

天麻 青黛 黃連 五靈脂

夜明砂微炒 川芎 蘆薈各二錢 龍膽草

防風 蟬蛻去足各一錢半 全蝎一枚焙 乾蟾頭炙焦三錢

麝香

右爲末猪膽汁浸米糕丸麻子大每服十丸薄荷湯下

靈脂丸　一二五　治脾疳食疳

白豆蔻　麥芽　五靈脂　砂仁

蓬术　青皮　橘紅　史君子焙各二錢

蝦蟇炙焦三錢

右爲末米糊丸麻子大每服十丸米湯下

如聖丸　一二六　治疳熱泄瀉

白蕪荑炒　川黃連　胡黃連各二兩半　史君子肉一兩　麝香五分另研　乾蝦蟇五個酒煮杵膏

右爲末以蝦蟇膏杵丸麻子大每服一二十丸煎人參湯下○薛按疳之爲患乃肝脾虛熱津液乾涸之證前方乃專於治疳清熱之劑若脾胃虛弱者當佐以六君子湯調補脾胃使邪氣退庶可收全功也

褐子丸一二七　治疳腫脹

蘿蔔子一兩微炒　陳皮　青皮炒　檳榔

五靈脂　蓬术煨　黑牽牛頭末炒　赤茯苓

木香二錢半

右為末麪糊丸菉豆大每服十五丸紫蘇湯下

消積丸一二八　治食積大便酸臭發熱

丁香九個　砂仁十二個　烏梅肉三個　巴豆二粒去皮

心膜

右為末麪糊丸黍米大每服五七丸濕水下

塌氣丸一二九　治肚腹膨脹

胡椒一兩　蝎尾五錢去毒

右爲末麪糊丸粟米大每服一二十丸陳米飲下

紫霜丸百三十　治驚積及變蒸發熱不解或食癎先寒後熱或乳哺失節宿滯不化腹痞便結

代赭石煅醋焠七次　赤石脂各一兩　杏仁五十個　巴豆三十枚去心膜油

右先將巴豆杏仁研成膏入代赭石脂研勻湯浸蒸餅丸粟米大每服三五丸米飲送下

化蠶丸 一三一

黄連五錢 蜀椒去閉口者炒出汗 苦楝根白皮各二錢

右爲末用烏梅肥者七個艾湯浸去核搗爛和丸艾湯量兒大小送下

下虫丸 一三二 諸疳蛔諸虫

苦楝根皮新白者酒浸焙 緑包貫衆 雞心檳榔

桃仁浸去皮焙 蕪荑焙 木香各二錢 鶴虱炒一錢

輕粉五分 乾蝦蟇炙焦三錢 史君子五十取肉煨

右爲末麪糊丸麻子大每服一二十丸天明清肉汁下〇一方内加當歸川連各二錢五分

史君子丸 一三三 治五疳蚘虫脾胃不和心腹膨脹時復作痛不食漸瘦

史君子肉 厚朴製 橘紅 白芍藥

甘草炒 川芎各一錢

右爲末蜜丸皂角子大每服一丸陳米飲化下

白玉散 一三四 治丹瘤

白土二錢半 寒水石五錢

右爲末米醋或新水調塗

以下通用方

四君子湯一三五 方在補陣一

治脾肺氣虛諸證

六君子湯一三六 方在補陣五

治脾胃虛弱嘔吐等證

五味異功散一三七 方在補陣四

治脾胃虛寒飲食少思等證

四物湯 一三八 方在補陣八

治一切血虛等證

八珍湯 一三九 方在寒陣十九

治氣血兩虛

十全大補湯 百四十 方在補陣二十

治氣血俱虛大補元氣

獨參湯 一四一 方在補陣三六

治氣虛氣脫挽回元陽

歸脾湯 一四二 方在補陣三三

治心脾虛損

參术湯 一四三 方在補陣四

治氣虛泄瀉嘔吐等證

參术膏 一四四 方在補陣四十

治中氣虛弱諸藥不應者

參苓散 一四五 方在補陣五四

治熱傷元氣止渴消煩定欬嗽喘促

五福飲 百五十 方在新補六

補五臟虛損

五君子湯 一五一 方在新熱六

治脾胃虛寒嘔吐泄瀉

理陰煎 一五二 方在新熱三

治脾腎虛寒諸證

溫胃飲 一五三 方在新熱五

治中寒嘔吐呑酸泄瀉少食

養中煎一五四　方在新熱四

治中氣虛寒嘔泄

參薑飲一五五　方在新熱八

治脾肺胃氣虛寒嘔吐欬嗽

六味回陽飲一五六　方在新熱二

治陰陽將脫等證

六味異功煎一五七　方在新熱七

治脾胃虚寒吐瀉兼滯者

六味丸一五八　方在補陣一二一

壯水補腎

八味丸一五九　方在補陣一二二

益火補陽

胃關煎百六十　方在新熱九

治脾腎虚寒瀉痢

佐關煎一六一　方在新熱十

治生冷傷脾瀉痢

五德丸 一六二 方在新熱十八

治脾腎寒滯一切瀉痢飱泄

二陳湯 一六三 方在和陣一


和脾消痰

芍藥枳朮丸 一六四 方在新和十六

健脾消積止腹痛除脹滿

枳朮丸 一六五 方在和陣七九

健脾胃消食積
大和中飲　一六六　方在新和七
治飲食留滞
小和中飲　一六七　方在新和八
治胸膈脹滿脾胃不和
四順清凉飲　一六八　方在攻陣二五
治血熱壅滞秘結
青州白丸子　一六九　方在和陣百十二



治風痰嘔吐牙關緊急

瀉青丸 百七十 方在寒陣一五一

治肝火急驚目赤

搖虫煎 一七一 方在新和十四

治諸蟲上攻胸腹作痛

景岳全書卷六十二


欽定四庫全書

子部

景岳全書卷六十三

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘



景岳全書卷六十三

明 張介賓 撰

痘疹

保元湯一 治痘瘡氣虛倒陷者

人參二三錢 炙甘草一錢 肉桂五七分 黄芪二三錢灌膿時酒炒回漿時蜜炙

水一鍾半加糯米一撮煎服○此藥煎熟或加人乳

好酒各半盞和服更妙酌宜用之○頭額不起加川芎三五分○面部加升麻三四分○胸腹加桔梗三四分○腰膝加牛膝四分○四肢不起加桂枝○嘔惡加丁香三四分○元氣虛寒加大附子七八分或一錢

調元湯 二 按此即保元湯無肉桂者名爲調元湯即東垣之黄芪湯也東垣用爲小兒治驚之劑魏桂巖用以治痘多效因美之名保元湯也葢小兒元氣未

充最易傷殘用此保全誠幼科王道之妙方但能因

此廓充則凡氣分血分虛寒虛陷等症皆可隨症增減用之無不可奏神效也

內補湯三 治痘瘡中虛等症

人參 黄芪 當歸 白术

川芎 甘草 茯苓 陳皮

厚朴

右等分水煎服

托裏散四 治痘毒元氣虛弱或妄行尅伐不能潰散用之未成自消已成自潰并治癰毒内虛不能起發

人參 黄芪炒各二錢 當歸酒洗 白朮

熟地 芍藥炒 茯苓各一錢半 炙甘草五分

右每用三五錢水煎服○外科樞要方有陳皮一錢半無甘草

解毒内托散五 治痘癰

金銀花 黄芪 當歸 赤芍藥

防風　甘草節　荆芥　連翹

木通

右水煎入酒少許服

陳氏托裏消毒散六　治瘡毒氣血虛弱不能起發腐潰收斂或發寒熱肌肉不生

人參　黄芪炒　當歸酒洗　川芎

芍藥炒　白术炒　茯苓　陳皮各一錢

金銀花　連翹　白芷各七分　炙甘草五分

右每服三五錢水煎服○外科方無陳皮

參芪內托散七　治痘瘡裏虛發痒或不潰膿或爲倒靨及瘡癰膿毒不化膿潰作痛等證

人參　黄芪蜜炙　當歸　川芎

厚朴薑製　防風　桔梗炒　白芷

紫草　官桂　木香　甘草等分

入糯米一撮水煎服○色淡白者去防風紫草白芷多加粘米○一方有芍藥

參芪四聖散 八 治痘瘡已出至六七日不起發不成膿

人參　黄芪炒　白术炒　當歸
川芎　芍藥炒　茯苓各五分　紫草
防風　木通各三分

右用水煎服

陳氏四聖散 九 治痘瘡出不快及倒靨因內實者

紫草茸　木通　炙甘草　枳殼麩炒

黄芪等分

右每服二錢加糯米一百粒水煎待米熟溫服

加味四聖散十　治痘瘡黑陷倒陷

人參　黄芪炙　川芎　甘草

紫草　木通　木香等分　蟬蛻十個

右加糯米百粒水一盞煎服

如聖湯十一　治毒盛不起

芍藥　升麻　乾葛各一錢　甘草

紫草　木通各三五分

水一鍾薑一片煎七分溫服不拘時

人參固肌湯十二　治痘瘡發表太過致肌肉不密或

痘痂久粘者

人參　黃芪　當歸酒洗　甘草

蟬蛻去土等分

水一鍾入糯米一撮煎服

人參透肌散十三　治痘瘡虛而有熱雖出快而不齊

隱於肌膚間者

人參　紫草如無紅花代之　白术　當歸

芍藥　茯苓　甘草　木通

蟬蛻　糯米等分

右每服三錢水一盞煎半盞徐服之

十宣散十四　一名托裏十補散○調氣補血内托瘡

毒五日後必用之方也亦治癰疽

人參　黄芪　當歸各二錢　川芎

防風　桔梗　白芷　甘草炙

厚朴各一錢　桂心三分

右爲細末每服一錢或二錢木香湯下

芎歸湯十五　亦名活血散　大能養營起痘

當歸倍用　川芎

右爲細末每服一錢紅花湯調服

活血散十六　治痘疹血虛血熱已出未盡煩躁不寧

腹痛

白芍藥酒炒

右爲末每服一匙糯米湯調下或荔枝湯亦可○此方對四君子湯加歸芪名參歸活血散

當歸活血散十七　治痘色淡白

當歸酒焙　赤芍酒炒　川芎　紫草

紅花各五錢　木香二錢　血竭一錢

右爲末每五歲者服一錢十歲已上服二錢酒下

養血化斑湯十八　治白疹白痘

當歸身　人參　生地　紅花

蟬蛻等分

水一盞生薑一片煎六分溫服無時

人參胃愛散十九　治痘疹已發未發吐瀉不止不思

飲食等證

人參　茯苓　甘草　丁香

藿香　紫蘇　木瓜　糯米

右每服三錢薑棗水煎

二仙散二十 治體寒肢冷腹痛口氣冷陰盛陽衰嘔吐泄瀉難發等證

丁香九粒 乾薑一錢炒

右爲細末每服五七分白湯送下被葢片時令脾胃温煖陰返陽回則痘變潤矣量大小加減與之

木香散二一 又名十一味異功散○治小兒痘疹虛寒多滯者宜此 陳氏

木香 丁香 大腹皮 人參

桂心　炙甘草　半夏製　訶黎勒

赤茯苓　青皮　前胡等分

右每服二三錢薑水煎

薛按曰前方治痘瘡已出未愈之間其瘡不光澤不起發不紅活五七日内泄瀉作渴或肚腹作脹氣促作喘或身雖熱而腹脹足指冷或驚悸或汗出或寒戰咬牙或欲靨不靨瘡不結痂或靨後腹脹泄瀉作渴此皆脾胃虛寒津液衰少急用此藥治之若誤認

爲實熱用寒涼之劑及飲蜜水生冷瓜果之類必不治

陳氏十二味異功散 二二 治元氣虛寒小兒痘疹色白寒戰咬牙泄瀉喘嗽等證

人參 丁香 木香 肉豆蔻

陳皮 厚朴 各二錢半 白朮 茯苓

官桂 各二錢 當歸 三錢半 製附子 半夏 各錢半

右咀每服二三錢薑棗水煎服○愚按陳氏此上二

方溫性有餘補性不足用治寒證則可用治虛證則不及也用者更當詳酌

陳氏人參麥門冬散 治痘瘡微渴

麥門冬一兩 人參二三 炙甘草 白朮

陳皮 厚朴薑製各五錢

右每服三四錢水一大盞煎至六分徐徐溫服量兒

增減

薛氏曰前方治痘瘡熱毒氣虛宜用之若因氣虛作

渴宜人參白术散

柴胡麥門冬散二四　治痘瘡壯熱經日不止更無他證者

柴胡二錢半　龍膽草一錢　麥門冬三錢　甘草炙　人參　玄參各錢半

右㕮咀每服三錢水一大盞煎至六分不拘時徐徐溫服量大小加減

按此方解表之功居六清火之功居四養營退熱此

方最宜

升均湯二五　治痘瘡已出不勻或吐瀉發熱作渴

升麻　乾葛　人參　白朮炒

芍藥炒　茯苓　甘草　紫草如無紅花代之

右每服三五錢薑水煎

升麻葛根湯二六　亦名升麻湯○解發痘毒之良方

升麻　葛根　芍藥　甘草等分

右㕮咀水一盞煎七分溫服無時

萬氏曰古人治痘以升麻葛根湯爲主後世好奇多立方法法愈多而治愈難矣苟能通變則痘疹諸證皆可增減用之不特發表解肌而已今以葛根湯爲主治隨證立增損法於後○初發熱解表加柴胡羌活白芷桔梗防風○口乾渴内熱也加葛粉天花粉麥門冬○自利加條實黄芩○嘔吐加半夏生薑○腹中痛加木香青皮枳殼山查肉○腰痛加獨活北

細辛○頭痛加羌活藁本蔓荆子○驚搐加木通生地黄燈心○小便少加木通車前瞿麥○大便秘加大黄○衄血加山梔仁玄參生地黄○發熱三四日熱甚不減須解其毒加大力子連翹紫草○瘡不出加防風蟬蜕荆芥穗紅花子○目痛加龍膽草密蒙花柴胡○瘡出太稠密加人參當歸木香紫草大力子防風桔梗○咽痛加桔梗連翹○瘡乾或帶紫或太赤者血熱也加當歸稍生地黄紅花地骨皮牡丹

皮○痘平陷灰白色氣虚也加人參白朮防風木香官桂○手足瘡不起脾胃不足也加人參黄芪防風官桂○泄瀉者裏虚也加人參白朮訶子白茯苓○瘡不著痂者濕也加黄芪防風官桂白芷

愚謂前方乃胃經發表之劑萬氏增減之法大意已悉但此方性味清凉純於疎泄必陽明多實多熱者乃宜用之然小兒氣血體質大都虚弱平和者十居七八故凡痘瘡初起乍見發熱用藥最貴和平兼養

營氣則庶乎盡善若預用清凉未免傷其胃氣全用解散未免虛其表氣二者受傷變患有不可測矣故余製柴歸飲爲治痘之先著所當酌宜用之若治麻疹則多屬火證此方乃所宜也

蘇葛湯 二七　初熱未見點發表之劑暫用之分兩宜酌兒大小以爲增減

蘇葉二錢　葛根二錢　甘草一錢　白芍藥錢半

連鬚葱白三根生薑三片水鍾半煎七分熱服○原

方有陳皮砂仁各五分此惟氣滯腹痛者宜用之否則不必

連翹升麻湯二八 散毒清火

連翹一錢 升麻 葛根 桔梗

甘草各七分 白芍藥五分 薄荷少許

右加淡竹葉燈草水一盞半煎一盞溫服無時

柴胡橘皮湯二九

柴胡 橘皮 人參 半夏

茯苓　黄芩等分

右加竹茹一團水一盞煎七分溫服不拘時

人參敗毒散三十　方在散陣三六

治時疫斑疹

荆防敗毒散三一　亦名消風敗毒散○發散痘疹俱可用及時氣風毒邪熱

柴胡　荆芥穗　防風　羌活

獨活　前胡　川芎　枳殼

人參　甘草　桔梗　茯苓等分

右切細加薄荷葉水一盞煎七分去滓溫服

柴葛敗毒散三二　疑似傷寒以此解散

柴胡　乾葛　人參　羌活

防風　荊芥　桔梗　蘇葉

甘草

右用生薑三片水煎服

參蘇飲三三　方在散陣三四

治傷風欬嗽傷寒痘疹

加減參蘇飲 三四 初熱見點解利之藥但表邪未達而元氣強壯者宜暫用之或前後感冒風寒俱可暫用

蘇葉 一錢 乾葛 錢半 前胡 八分 陳皮 七分

枳殼 六分 桔梗 甘草 各四分

水一鍾半加生薑三片煎服

麻黄甘草湯 三五 冬月痘毒熾盛表實者宜用之

麻黄一二錢　生甘草減半

水煎服

柴葛桂枝湯三六　表散痘熱

柴胡　乾葛　桂枝　防風

甘草　人參　白芍藥

水一盞加生薑三片煎七分溫服

桂枝葛根湯三七　解散寒邪

桂枝　葛根　升麻　赤芍藥

防風　甘草各一錢

右加生薑三片淡豆豉一錢水一鍾煎七分溫服無時

十味羌活散三八　此初熱見點解利之劑若小兒身壯力強者可用蘇葛以行表其次者宜此和解疎利之藥若虛而宜補者必當歸顧元氣不得單用此類

羌活　前胡　防風各一錢　荊芥

獨活各八分　細辛　白芷各三分　柴胡

炙甘草　蟬蛻各四分

水一鍾半加薄荷三葉煎五分不拘時服○發搐及熱盛不退者調入製過硃砂末服之神效

十三味羌活散三九　解熱散毒治風壅欲作痘疹者

羌活　獨活　防風　桔梗

荊芥　柴胡　前胡　地骨皮

炙甘草　蟬蛻　川芎　天花粉

天麻等分

右爲細末每服二三錢水一盞入薄荷葉三片煎四分溫服

羌活湯四十　解發痘瘡兼治肝熱驚狂

羌活　川芎　防風　山梔仁

龍膽草　當歸等分　甘草減半　淡竹葉

薄荷葉

水煎溫服無時

雙解散四一　痘疹表裏俱實者非此不解

防風　川芎　當歸　連翹
芍藥　薄荷　大黃各五分　石膏
桔梗　黄芩各八分　荆芥穗　白术
桂枝各二分　滑石二錢四分　甘草二錢
水二鍾加生薑三片煎一鍾温服無時○此即防風通聖散減去麻黄芒硝梔子外加桂枝也
柴胡散子四二　治痘瘡表裏俱實良方
柴胡　防風　當歸　人參

白芍藥　甘草　黄芩　滑石

大黄等分

右加生薑一片水煎服

桂枝大黄湯四三　治腹痛大便不通良方

桂枝　白芍各二錢半　甘草五分　大黄一錢半

右剉細加生薑一片水一鍾半煎八分食前溫服

防風芍藥甘草湯四四　解痘毒及陽明經痘出不快

防風　芍藥　甘草等分

右每服一二錢水煎服

荆芥防風甘草湯四五　解痘毒及太陽經痘出不快

荆芥　防風　甘草等分

右每服一二錢水煎

蟬蛻膏四六　治痘瘡虛陷不起

蟬蛻　當歸　川芎　甘草

升麻　防風　荆芥穗等分　加人參

白芍藥

右爲末煉蜜丸如芡實大每服一丸薄荷湯下

消毒散 四七 亦名消毒飲 治痘瘡六七日間身壯熱不大便其脈緊盛者用此藥微利之

荆芥穗 炙甘草各一兩 牛旁子四兩杵炒

右爲粗散每服三錢水一盞煎七分不拘時徐徐服

四味消毒飲 四八 治痘瘡熱盛毒氣壅遏無問前後皆可服

人參 炙甘草 黄連 牛旁子等分

右爲粗末每服一錢加薑一片水一盞煎四分去滓溫服不拘時

六味消毒飲 四九 解痘毒

牛旁子　連翹　甘草　綠升麻

紫草　山豆根 等分

水一盞煎七分溫服不拘時

消毒化斑湯 五十 消風散毒清眼目咽喉

升麻　柴胡　桔梗　甘草

連翹　龍膽草　牛蒡子　防風

蟬蛻　密蒙花

水一鍾半加淡竹葉十片煎服

解毒湯五一　治一切熱毒腫痛或風熱搔痒

黄連　金銀花　連翹

右水煎服

真人解毒湯五二　治痘毋

忍冬花半斤　甘草節一兩　木通　防風

荆芥　連翹各三錢

右分作三劑用水酒各一鍾煎服以腫消痘出爲度

葛根解毒湯五三　解痘毒止渴良方

葛根　升麻減半　生地黄　麥門冬

天花粉等分　甘草減半

右取糯米泔水一盞煎七分入茅根自然汁一合服之

實表解毒湯五四

人參　黄芪　當歸稍　生地黄
甘草　白芍藥　柴胡　升麻
酒片芩　玄參　地骨皮
右入薄荷葉少許淡竹葉十片水煎服
遡源解毒湯五五　解胎毒之良方
當歸身　川芎　生地黄　白芍藥
人參　生甘草　黄連　連翹
陳皮　木通等分

水一盞加淡竹葉十片煎半盞溫服無時

陳氏解毒防風湯 五六 治痘瘡毒氣熾盛

防風　黄芩　地骨皮　白芍藥

荆芥　牛旁子

右每服四五錢水煎服或爲末白湯調下○外科解毒防風湯方見本門六三

化毒湯 五七 治痘未出腹痛者

白芍藥　炙甘草各一錢　木香　青皮

枳殼各七分　山查肉　連翹　肉桂各五分

水一盞煎七分溫服不拘時

消風化毒湯五八

防風　黄芪　桂枝　荆芥穗

升麻　白芍　牛旁子等分　甘草減半

右加薄荷葉七片水一盞煎七分溫服無時

凉血化毒湯五九　治痘瘡初出頭焦黑

歸尾　赤芍藥　生地黄　木通

連翹　牛蒡子　紅花　紫草

桔梗　山豆根

右水煎服〇或加童便一小盞亦可

犀角化毒丸 六十 治諸積熱及痘疹後餘毒生瘡口舌牙齦糜爛等證

犀角屑 鎊　生地黄　當歸　防風

荆芥穗 各一兩　牛蒡子 炒杵　赤芍藥　連翹

桔梗 各七錢　薄荷　黄芩　甘草 各五錢

右爲末煉蜜丸芡實大每服一丸薄荷湯下

五福化毒丹六一 治胎毒及痘後頭面生瘡眼目腫痛

生地黄 天門冬 麥門冬 玄參

熟地黄各三兩 甘草 甜硝各二兩 青黛半兩

右爲末煉蜜丸芡實大每服一丸白湯或薄荷湯化下

外科五福化毒丹六二 方在外科七六

治一切熱毒瘡癤

犀角散六三　治痘瘡癰毒時毒熱盛煩躁多渴小便赤澁或赤斑

犀角鎊　甘草炙各半兩　防風　黄芩各一兩

右爲粗末每服二錢水一小盞煎五分温服無時

紫草化毒散六四　解實熱毒發痘

紫草　升麻　炙甘草等分　糯米五十粒

水煎服

紫草散 六五　治痘疹黑陷氣血虛弱瘡疹不起

紫草　黃芪炙　炙甘草　糯米各錢半

右水煎服

紫草飲 六六　治痘瘡黑陷不起

紫草　當歸　芍藥　甘草

麻黃等分

水一盞煎不拘時服

紫草飲子 六七　治倒陷腹脹大小便秘

紫草　人參　枳殼　山查

木通　穿山甲土拌炒　蟬蛻

水一盞煎五分作三四次溫服

紫草快斑湯六八　一名紫草湯○治痘疹血氣不足

或血熱不能起發色不紅活不灌膿等證

紫草　人參　白朮　當歸

川芎　芍藥　茯苓　甘草

木通等分　糯米

右每服三五錢水煎

紫草木香湯 六九 治痘瘡裏虛痒塌黑陷悶亂

紫草　木香　人參　白朮

茯苓　甘草 炙　糯米

右每服三錢水煎

紫草木通湯 七十 治痘疹出不快

紫草　人參　茯苓　木通

甘草 減半　糯米 等分

右每服二三錢水煎服

紫草膏七一 紅紫黑陷者暫用之

紫草茸 白附子 麻黄去節湯泡去黄沫曬乾用

甘草炙各半兩 殭蠶炒 全蝎炒各八枚

右爲細末用白蜜一兩好酒半盞先將紫草煎熬成膏旋入各藥丸皂子大每服一丸紫草煎湯化下就用補藥調理○如治驚搐以金箔爲表薄荷湯下

紅綿散七二 亦名天麻散○治痘疹身有大熱面赤

氣粗無汗而表未散者可服之此藥以麻黄天麻發表爲主有汗者不可服蓋腠理已開不可再發汗也若有汗而熱則當以惺惺散爲和解之劑故仲景之治表證有宜發汗者有宜和解者有宜調和營衛者若有汗而熱者則和解爲宜虛而熱者則調和營衛爲宜如和中散寒之類是也

麻黄去節　天麻　荆芥　炙甘草各二錢　全蝎全者七枚

右為末每服一錢以水半盞薄荷葉二片入酒四五滴煎二三沸帶熱服之如疹未出再進一服次又一服即傷風寒證服亦無妨

快斑湯七三 治起發遲

人參五分 當歸 防風 木通各一錢

甘草三分 木香 紫草 蟬蜕各二分

水一盞煎七分温服不拘時

快斑越脾湯七四 治痘瘡手足不起發

黄芪炙　白芍藥　桂枝　防風

炙甘草

右加生薑一片棗一枚水煎服

快透散七五　治痘出不快

紫草　蟬蛻　木通　芍藥

炙甘草等分

右每服二錢水煎

王海藏先生云身後出不快足太陽經也用荆芥甘

草防風湯身前出不快手陽明經也用升麻葛根湯四肢出不快足陽明經也用防風芍藥甘草湯此皆解毒升發之藥也不可不知

鼠粘子湯七十六　治痘稠身熱毒盛服此以防青乾黑陷并治斑疹稠密

牛蒡子炒　歸身　黄芪　炙甘草

柴胡　黄芩酒炒　連翹　地骨皮

右等分水煎熱退則止服

射干鼠粘子湯 七七 治痘瘡壯熱大便堅實或口舌生瘡咽喉腫痛皆餘毒所致

鼠粘子 四兩炒杵 甘草 炙 升麻 射干 各一兩

右每服三錢水一大盞煎六分徐徐溫服

薛氏曰前方若痘疹初出發熱焮痛根盤赤盛或咽喉口舌疼痛作渴引飲者宜用若因胃氣虛弱發熱而致前證者宜人參麥門冬散

錢氏獨聖散 七八 治痘瘡倒靨陷伏

用穿山甲取前足嘴上者燒存性爲末每服四五分以木香湯入少酒服之或紫草湯亦可

無價散七九 治一切痘瘡倒陷焦黑危急之證

人牙　猪牙　狗牙　猫牙

右以炭火燒去烟存性等分爲末每服三分熱酒調下○如痒瘍寒戰泄瀉煎異功散調下○一方人牙散只用人牙燒去烟存性爲末酒調服

三酥餅八十 治初發熱用以表汗解毒稀痘神效

辰砂　擇上好明淨無砂石者以絹囊盛之用麻黄升麻紫草荔枝殼同煮一日夜研細仍用前湯飛過曬乾再研極細用真蟾酥另調作餅子

麻黄　去節湯泡過曬乾爲極細末亦用蟾酥另

調作餅

紫草　研極細亦用蟾酥另調作餅

蟾酥　於端午日捉蟾取酥捻前三餅每餅加麝香少許微炒

右方如遇時行痘疹小兒發熱之初每三歲者將三餅各取半分熱酒化下葢覆出汗如不能飲酒用敗毒散煎湯化下更好○若痘已出滿頂紅紫色爲熱毒之盛宜煎紫草紅花湯或化毒湯將辰砂紫草二餅調下少許以解之但痘出之後不可服麻黄餅也葢辰砂能解毒紫草凉心火製過亦能發痘解毒麻黄能發表發痘蟾酥能驅臟腑中毒氣從毛竅中作臭汗而出此四藥誠解毒稀痘之神方也

神應奪命丹 八一 治風邪倒陷及痘毒入裏

辰砂 擇牆壁鏡面者以白紗囊盛之用升麻麻黄紫草連翹四味同入砂罐以新汲水桑柴火煮一晝夜取出將砂研細仍將煮砂藥汁去滓飛取末待乾聽用二錢

麻黄連根節酒蜜拌炒焦八分 蟬蜕洗淨去足三分 紫草酒洗五分

紅花子五分 穿山甲酒炒五分 真蟾酥三分

右共研細末用醅酒杵丸分作十粒周歲者半丸二

歲者一九服止三九熱酒化服厚葢取汗汗出痘隨出也擇天醫生炁日修合○此方與三酥餅功同

萬氏奪命丹 八二 治倒陷解發痘毒

麻黄 蜜酒炒焦 升麻 各五錢 山豆根 紅花子

大力子 連翹 各二錢半 蟬蛻 紫草

人中黄 各三錢

右研細末酒蜜和丸辰砂爲衣薄荷葉煎湯下

東垣涼膈散 八三 解痘疹囊熱良方

黄芩　連翹爲君　甘草　梔子

薄荷　桔梗　竹葉

右水煎服

退火丹八四　治痘中狂安神方

滑石　硃砂飛各一錢　冰片三釐

共爲細末冷水調一分服得睡少時神安氣寧痘轉

紅活矣

陳氏通關散八五　通心經降心火利小便良方

山梔仁　大黃炒各一分　木通　甘草炙

車前子炒　赤茯苓　人參　瞿麥

滑石各三分　萹蓄炒五分

右用水一盞燈草十根煎半盞溫服

玄參地黃湯八六　治痘疹衂血

玄參　生地黃　牡丹皮　梔子仁各錢

半　甘草　升麻各半錢　白芍藥二錢

蒲黃炒五分

水一鍾煎七分溫服○愚謂此方宜去升麻以塞上衝之源勿謂但屬陽明即宜用升麻也

萬氏清肺飲八七 治肺熱喘嗽聲啞

麥門冬 桔梗各二錢 荆芥穗 天花粉

知母各一錢 石菖蒲 訶子仁各八分

右水煎服○此當與清肺湯參用方在後一四五

導赤通氣散八八 治心虛聲不揚者

木通 生地黃 人參 麥門冬

當歸身　石菖蒲　甘草

右加燈心水煎服

甘桔清金散八九　治肺熱咽痛聲不清

桔梗一兩　甘草　連翹各半兩　訶子皮三錢

牛旁子炒七錢

右爲細末每服一錢薄荷葉少許同煎服

加味甘桔湯九十　咽喉腫痛暫用

桔梗八分　甘草二錢分　牛旁子　射干各六分

防風　玄參各四分

水一鍾煎服或加生薑一片○熱甚者加黃芩去防風亦可

大如聖飲子九一　治瘡疹痘毒攻咽嗌腫痛熱渴或成腫毒不消等證

桔梗　甘草　鼠粘子炒各一兩　麥門冬五錢

右每服二錢水煎

萬氏橘皮湯九二　行滯消痰止嘔吐

橘皮半去白炒二錢 半夏一錢 白茯苓錢半

右加生薑三片水一盞煎七分溫服

匀氣散九三 行氣化滯

木香 青皮各五錢 山查肉二錢半

右爲末每服一錢甘草湯調服

前胡枳殼湯九四 治痰實壯熱胸中煩悶大便堅實

臥則喘急

前胡一兩 枳殼 赤茯苓 甘草炙

大黃各半兩

右㕮咀每服三五錢水一大盞煎至六分不拘時溫服此方宜量大小加減如身溫脈微并瀉者不可服

薛氏曰前證若屬肺胃實熱氣鬱痰滯大便秘結小便赤澁煩渴飲冷身熱脈實者宜用之以疎通內臟使邪無壅滯則痘瘡輕而易愈也

當歸丸九五　治便堅三五日不通者

當歸半兩　紫草三錢　黃連錢半炒　炙甘草一錢

大黄二錢半

右以當歸紫草熬成膏下三味研爲細末以膏和爲丸如胡椒大三歲以下兒服十丸七八歲兒二十丸食前清米飲下漸加之以和爲度

百祥丸 九六 治痘瘡紫黑乾陷熱毒便秘裏實等證

紅芽大戟不拘多少用漿水煮極軟去骨日中曬乾復内原汁中煮汁盡焙乾研末水丸粟米大每服一二十丸研赤芝麻湯下

棗變百祥丸 九七 治同前而稍緩可代百祥丸

紅芽大戟 去骨 一兩　青州棗肉 三十 個

右用水一碗同煎至水盡爲度去大戟不用將棗焙乾可和作劑或搗爛爲丸從少至多以木香湯吞服至利爲度

排毒散 九八 治痘毒發癰

大黄　當歸稍 各一 兩　白芷　沈香

木香 各半 兩　穿山甲 七片土 炒焦

右爲細末看虚實大小加減長流水煎沸調服

錢氏苦參丸九九 治痘後潰爛瘡毒疥癩

苦參一兩 白蒺藜 何首烏 牛蒡子

荆芥穗各半兩

右爲末酒調麪糊爲丸竹葉湯下○外科苦參丸見本門八八

稀痘方百

用老鼠去皮取肉水煮熟量兒大小與食數次出痘

甚稀未食葷時與食尤效屢試屢驗

稀痘酒 百一 最能散毒稀痘

麻黄 去節泡 紫草 各二兩

右二味細切布囊盛之浸無灰酒一小壜泥封固凡遇天行小兒發熱時與半杯或一杯量兒大小服之出微汗爲佳

三痘湯 百二 痘發時預服之

大黑豆 赤小豆 菉豆 等分淘淨

右用甘草浸水去渣以甘草水煮豆熟爲度逐日空心任意飲其汁自然出少○此方冬月煮熟令兒常食豆尤妙

絲瓜湯 百三 解瘡毒○一方無山查

絲瓜 升麻 芍藥酒炒 生甘草

山查 黑豆 赤小豆 犀角鎊等分

右爲粗散每服三錢水一大盞煎至六分不拘時徐徐温服量大小加減

辰砂散 百四 預解痘毒

好辰砂 一錢飛 老絲瓜 近蒂三寸連子燒灰存性此物發痘瘡最好

右研末蜜水調服多者可少少者可無或以紫草甘草湯調服尤佳

保嬰丹 百五 稀痘

纏豆藤 或黃豆或菉豆梗上纏繞細紅藤是也於八月生烝日擇取陰乾聽用一兩

防風 荆芥穗 牛蒡子炒 紫草茸去根酒浸一兩 新升麻鹽水炒 甘草去皮各五錢 天竺黃真者

三錢　蟾酥真者一錢　牛黄真者一錢　赤小豆

黑豆　菉豆各三十粒略炒勿焦　好硃砂用麻黄紫草荔枝殼升麻同煮過復以此汁飛過三錢

右另用紫草二兩入水二碗煎膏至少半碗入沙糖一小鍾將前各藥爲細末同紫草膏丸如李核大即以硃砂爲衣於未痘之先濃煎甘草湯每磨服一丸大者二丸若已發熱用生薑湯磨服葢被睡而表之多者可少少者可無大有神效○一方無紫草茸仍

有經霜老絲瓜一箇連藤蒂五寸燒存性同用

洗肝明目散百六 治痘後目疾

當歸 羌活 柴胡 蜜蒙花

川芎 防風 木賊 山梔仁

龍膽草各等分

右爲末每服一錢淡沙糖水調服

洗肝散百七 翳膜遮睛暫用

歸尾錢二分 防風八分 大黃八分 羌活

川芎　薄荷各四分　梔子錢半　甘草三分

水一鍾薑一片煎服○熱盛便秘加苓栢

羊肝散百八　治疸毒入眼或無辜疳氣入眼

密蒙花二錢　青葙子　決明子　車前子炒各一錢

右為末用羊肝一大葉薄批摻上濕紙裹煨熟空心食之

蒺藜散百九　治疸瘡入眼腫痛

白蒺藜　穀精草　防風　羌活
生蛤粉等分
右爲細末每服二錢溫水調服即退
蟬菊散百十　治痘疹入目或病後生翳障
蟬退去肚淨　白菊花等分
每服一二三錢水八分加蜜少許煎四分食後溫服
秦皮散百十一　治大人小兒風毒赤眼痛癢澁皺眵
淚羞明

秦皮　滑石　黄連等分

湯泡熱洗日二三次

通神散百十二　治痘瘡入眼生翳膜

白菊花　穀精草　菉豆皮

右爲末每服一錢用柿餅一個米泔水一盞同煎候水乾只喫柿餅每日三五次不拘至七日效

錢氏黄柏膏百十三　用此護眼可免痘毒入目

黄柏一兩　菉豆末二兩　生甘草三兩

右爲細末以麻油調成膏用塗耳前眼角目下四五遍若早塗之痘出必稀若既患眼塗之必減

痘疔散百十四

雄黃一錢　紫草三錢

右爲細末胭脂汁調用銀簪脚挑破黑痘入藥在內

此下二方皆治痘疔之良方也

四聖丹百十五　治黑疔

牛黃三錢分　兒茶七錢分　硃砂八分　珍珠二分

右爲極細末以綿胭脂汁或油胭脂調勻先用銀針挑破黑疔拭去惡血乃點藥疔上

萬氏四聖散百十六 治痘不起發變黑而痛者痘疔也亦名鬼痘

菉豆四十九粒 豌豆四十九粒各燒存性 珍珠一分 油頭髮燒存性一分

右爲細末用胭脂水調先以簪脚撥開黑痘以此塗之

神效隔蒜灸法 百十七

治癰疔毒氣熾盛使諸瘡不能起發已起發者不能貫膿已貫膿者不能收斂或大痛或麻木痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火而散其法用大蒜頭切三分厚安瘡疔上用小艾炷於蒜上灸之每五壯易蒜再灸若紫血出後腫痛不止尤當用灸治者審之○愚在京師嘗見治瘡疔者即以線鍼挑破出毒血諸瘡隨即貫膿若挑破不痛不出血者難治若用此法治之即知痛更用鍼挑

破紫血隨出諸痘隨貫亦有生者

胡荽酒百十八　辟穢氣使痘疹出快

用胡荽一把以好酒二盞煎一兩沸令乳母每含一兩口噴兒遍身或噴頭面房中須燒胡荽香以辟除穢氣能使痘疹出快煎過胡荽懸房門上最妙○或用棗炙之兒聞棗香尤能開胃氣進飲食解毒氣○按此酒惟未出之前及初報之時宜用之若起脹之後則宜避酒氣亦忌發散皆不可用也

茵陳薰法 百十九

用乾茵陳研末擣棗膏和丸如雞子大曬乾用烈火

燒烟薰之

水楊湯 百二十 治倒陷之良方

水楊即忍冬藤也春冬用枝秋夏用枝葉生水邊細

葉紅梗枝上有圓果滿果有白鬚散出切斷用長流

水一大釜煎六七沸先將三分之一置浴盆内以手

試其適可仍先服煎藥然後浴洗漸漸添湯以痘起

發光壯為度不拘次數洗畢照視若纍纍然起處覺

暈暈有糸此漿影也如漿不滿宜再浴之若弱者只

浴頭而手足亦可此則不厭多洗洗後如無起勢乃

氣血敗而津液枯多不可治

秘傳茶葉方 一二一 鋪牀蓆用

茶葉要多揀去粗梗入水一煮取起再揀去梗濕鋪

於牀上用草紙隔層令兒睡上一夜則膿水皆乾

猪髓膏 一二二 治痘瘡不靨及痂靨不落者塗之即

落

猪骨髓　白蜜

右二味以火熬一二沸退凉用雞翎掃上即落

自花膏一二三　治痘燥痂皮濺起作痛或瘡痂欲落不落者白蜜不拘多少畧用湯和時時以鵞翎潤痛處瘡痂亦易落無痕

蕎麥散一二四　治痘瘡潰爛以此傳之

蕎麥一味磨取細麪痘瘡破者以此敷之潰爛者以

此遍撲之絹袋盛撲或以此襯卧尤佳

臙脂汁一二五　治黑痘之良方

先用升麻一味煎濃湯去滓却用綿臙脂浸於湯内

揉出紅汁就以本綿醮湯於瘡上拭而塗之

敗草散一二六　治痘瘡撾搔成瘡膿血淋漓謂之斑

爛用蓋屋蓋牆爛草多年者佳或曠野自爛者尤佳

爲末搽摻之〇或氣血虚熱不愈而遍身患者須多

摻蓆鋪上令兒坐卧其上其瘡即愈

白龍散 一二七 治爛痘及抓破者

用乾黄牛糞在風露中多久者火煆成灰取中心白者爲末以薄絹囊盛裹於瘡上撲之

救苦滅瘢散 一二八 治爛痘以此傅面如誤抓破者用之傅貼最良

蜜陀僧 滑石各二兩 白芷半兩

右爲細末濕則乾摻之或用好蜜調傅

滅瘢散 一二九 治痘後面瘡以此傅之

蜜陀僧　白附子　白殭蠶　白芷

鷹矢白等分

右研極細末以水調搽面默神效

辟邪丹百三十　用燒於房中能辟一切穢惡邪氣

蒼朮以黄速代之更妙　乳香　降真香

甘松　北細辛　芸香各等分

右爲末水丸如豆大每焚一丸薫之良久又焚一丸不可太多只是畧有香氣使之不斷可也

砭法 一三一 治丹瘤

用細磁器擊碎取鋒鋩者以筯一根劈開頭夾定用線縛住兩指輕捻筯梢令磁鋒正對毒頂懸高寸許另用一筯輕擊筯頭令毒血遇刺而出即可解散

蜞鍼法 一三二 治疽癰及丹瘤

用水蛭大者五六根放腫毒頭上吮去惡血可以消丹瘤決癰腫

雄黃散 一三三 治疽後牙齦生疳蝕瘡

雄黄一錢 銅緑二錢

右爲末乾摻之

綿繭散一三四 治痘瘡餘毒肢體關節生疳蝕瘡膿水不絶

出蛾綿繭不拘多少 生白礬入繭内以炭火煅枯

右爲細末乾貼疳瘡口内○此總治瘡毒膿水淋漓收斂之外劑

搽牙散一三五 治痘後餘毒攻牙生疳一日爛進一

分急用此搽之

銅綠　雄黃　五棓子　枯礬

胡黃連　北細辛　烏梅同褐子包固火煆存性

右等分爲末搽之

吹口丹一三六　治疳

黃連　青黛　兒茶　片腦

右等分爲末吹之

生肌散一三七　痘後癰毒不收口用之神效

枯礬三錢　海螵蛸　赤石脂煅各二錢　龍骨煅
黄丹飛炒　乳香出汗　沒藥出汗各一錢　血竭五分
輕粉　麝各二分
為細末摻瘡口内外以太乙膏貼之

馬鳴散一三八　治走馬疳良方

人中白即尿缸底白垽也以物刮取新瓦盛之火煅如白鹽乃佳半兩　五棓子生者
一錢另用一錢同礬煅之　馬鳴退即蠶退紙也火燒過二錢半　枯白礬二錢
即用五棓子一錢入礬於内煅枯者

右爲極細末先以濃米泔水浸洗瘡口以此傅之

以下麻疹方

升麻湯 一三九 解散疹毒

升麻 去鬚 葛根 去皮各一錢 芍藥 酒浸二錢 炙甘草 一錢

水一盞煎五分食遠稍熱服量人大小加減

予按此方即升麻葛根湯也麻疹之證多屬陽明火毒凡欲解表散邪但表實邪盛者最宜用此然愚謂以柴胡代升麻用之更妙若血氣稍虛而邪有未解

者惟柴歸飲爲最妥

升麻透斑湯百四十　治痘疹初見紅點一日至三日

升麻　枳殼麸炒各五分　柴胡錢半　桔梗

前胡各一錢　乾葛　川芎　茯苓各七分

陳皮　半夏　甘草各四分

右加生薑一片水一鍾煎五分作十餘次徐服之

葛根麥門冬散一四一　治小兒熱毒斑疹頭痛壯熱

心神煩悶

葛根三錢　麥門冬四錢　人參　川升麻

茯苓　甘草各二錢　石膏半兩　赤芍藥一錢

右㕮咀每服三錢水一大盞煎至六分不拘時徐徐

溫服仍量兒大小增減

薛氏曰前方足陽明胃經之藥也外除表邪內清胃

火兼補元氣若非發熱作渴表裏有熱者不可用若

表裏俱虛而發熱作渴者宜用人參麥門冬散

萬氏麥門冬湯一四二　治表邪內熱欬嗽甚者○此即

前方去人參者但分兩稍異耳

麥門冬　葛根去皮各一錢　升麻去鬚四分　赤芍藥酒炒

茯苓各六分　炙甘草四分　石膏煅一錢半

右水煎服

萬氏柴胡四物湯一四三　治疹後餘熱

柴胡　當歸身　川芎　生地黄

白芍藥　人參　麥門冬　知母

淡竹葉　黄芩　地骨皮

右㕮細水一盞煎七分不拘時溫服

生地黄散一四四　治小兒斑疹身熱口乾欬嗽心煩者

生地黄半兩　麥門冬七錢　款冬花　陳皮　杏仁各三錢　炙甘草二錢半

右每服三五錢水一大盞煎六分不拘時徐徐溫服量大小加減

清肺湯一四五　治斑疹欬嗽甚者或二母散或麥門

冬湯

桔梗去蘆 片芩 貝母各七分 防風去蘆

炙甘草各四分 知母七分

右水一鍾煎五分入搗碎蘇子五分再煎溫服

清肺消毒湯一四六 治疹瘡收完不思飲食鼻乾無涕

防風 枳殼各五分 連翹 前胡

黃芩 桔梗一錢 荊芥 炙甘草

右水一鍾煎至五六分作十餘次徐服之

門冬清肺湯 一四七 治疹後欬嗽不止

天門冬去心 麥門冬去心 款冬花 知母

貝母 桔梗 牛旁子 地骨皮

杏仁去皮尖 馬兜鈴 甘草等分

水一鍾半煎七分食後溫服

清肺消毒化痰湯 一四八 治疹後喘嗽聲音不清不

思飲食眼目不清唇口乾燥

牛蒡子 防風 荆芥穗 貝母各五分

連翹 黄芩 前胡 茯苓各七分

桔梗 枳殻各一錢 甘草三分

右水一鍾煎五分作十餘次徐服之

清金降火湯百四九 治疹後肺熱聲啞欬喘

當歸 白芍藥酒炒 生地黄酒洗 瓜蔞仁

白茯苓 陳皮 貝母去心 甘草

麥門冬 桑白皮 枯芩酒炒 山梔炒

玄參　杏仁去皮尖　蘇梗　天門冬

黄連炒　石膏

右等分加薑一片水煎服

二母散百五十　方在寒陣四九

治肺熱欬嗽及疹後嗽甚者

透斑中和湯一五一　治疹瘡二三日泄瀉

升麻　乾葛　豬苓　澤瀉

陳皮　半夏　川芎　茯苓各七分

前胡　桔梗各一錢　柴胡錢半　甘草三分

右加生薑三片水一鍾煎至五分作數次徐徐服之

解毒化滯湯一五二　治疹後喫食太早咬指甲撕口唇摭眼毛看手咬人等證

防風　荊芥　枳殼　神麯炒

麥芽炒各五分　連翹　黃芩　茯苓

前胡各七分　桔梗一錢　山查　甘草各三分

右水一鍾煎五分作十餘次徐徐服之

大青湯一五三　解斑疹大毒良方

生地黃　石膏　玄參　地骨皮

知母　木通　甘草　青黛

荆芥穗各等分

右水一盞加淡竹葉十二片煎七分溫服無時

羚羊角散一五四　治小兒斑疹後餘毒不解上攻眼

目羞明雲翳眵淚俱多紅赤腫閉

羚羊角鎊　黃芪　黃芩　草決明

車前子 升麻 防風 大黄

芒硝等分

水一盞煎半盞稍熱服

羌菊散一五五 治痘疹熱毒上攻眼目生翳并暴赤

羞明

羌活 甘菊花 蟬蜕 蛇蜕

防風 穀精草 木賊 甘草

白蒺藜 山梔子 大黄 黄連

沙苑蒺藜等分

右爲末每服一錢清米湯調下

以下通用方

人參理中湯一五六　方在熱陣一

治脾胃虛寒諸證

六物煎一五七　方在新因二十

治痘疹血氣不足隨證加減用

六氣煎一五八　方在新因二一

治痘疹初起表邪強實者

五積散 一六三 方在散陣三九

溫散寒邪

四順清涼飲 一六四

治血脈壅熱大便秘結

涼血養榮煎 一六五

治痘瘡血虛血熱地紅熱渴

搜毒煎 一六六 方在新因十九

解痘疹熱毒紫黑乾枯

犀角地黃湯一六七　方在寒陣七九

治痘疹血熱諸證

仲景黃芩湯一六八　方在寒陣百五

治熱利

透邪煎一六九　方在新因二三

治痘疹初熱未出者宜此蘇表達邪

化斑湯百七十　方在寒陣三

治陽明熱渴化斑除煩

小柴胡湯一七一　方在散陣十九

散肝膽經表邪往來寒熱

益元散一七二　方在寒陣百十二

解煩熱止渴利小水

四苓散一七三　方在和陣一八七

利小水去濕滯

導赤散一七四　方在寒陣一二二

降心火及小腸熱證

景岳全書卷六十三